VEGANO

SEAÔMEGA7

A chave para a síndrome metabólica

Sua fonte diária de Ômega 7

Benefícios no tratamento da síndrome metabólica

Auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares

Propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias

SEAÔMEGA 7® é um suplemento alimentar em pó obtido a partir do óleo do fruto do espinheiro-marítimo (*Hippophae rhamnoides* L.), padronizado em Ômega 7 (>15%), além de contar com quantidade sinérgicas de Ômega 9, Ômega 6 e Ômega 3. O Ômega 7 é um ácido graxo pouco encontrado no reino vegetal, o que dificulta sua suplementação a partir de fontes vegetais. O **SEAÔMEGA 7®**, por sua vez, é uma alternativa vegana eficaz para atender a essa demanda.

EFEITOS BENÉFICOS NA SÍNDROME METABÓLICA

- Reduz o LDL
- Aumenta o HDL
- Reduz a glicemia e os triglicerídeos
- Reduz resistência insulínica
- Reduz a inflamação
- Reduz o apetite
- Melhora no peso e composição corporal

Comparado às terapias convencionais utilizadas no tratamento da síndrome metabólica, o **SEAÔMEGA 7®** oferece amplos benefícios, semelhantes aos dos medicamentos usados no controle de colesterol, triglicerídeos e glicemia, mas sem os efeitos adversos comumente associados a essas terapias.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Adolescentes e crianças a partir de 10 anos: Ingerir uma dose diária de 500 a 1000 mg.
Adultos: Ingerir uma dose diária de 500 a 1500 mg.

FORMAS FARMACÊUTICAS

Cápsula, chocolate, goma, sachê e suspensão oral.

CONTRAINDICAÇÕES

A administração oral de **SEAÔMEGA 7®**, nas doses recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado por gestantes e lactantes.

100% NATURAL | GLÚTEN FREE | CERTIFICADO GMO

REFERÊNCIAS:

Stefan N, Kantartzis K, Celebi N, et al. Circulating Palmitoleate Strongly and Independently Predicts Insulin Sensitivity in Humans. Diabetes Care. 2010 fev;33(2):405-407. Stockton, C. Omega-7 Protects Against Metabolic Syndrome. Life Extension. Revisado por: Shaylind Benson, em outubro de 2024. Yang ZH, Miyahara H, Hatanaka A. Chronic administration of palmitoleic acid reduces insulin resistance and hepatic lipid accumulation in KK-Ay Mice with genetic type 2 diabetes. Lipids Health Dis. 2011;10:120. Yang, B.; Kallio, H.P. Fatty Acid Composition of Lipids in Sea Buckthorn (Hippophaë rhamnoidesL.) Berries of Different Origins. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 49, n. 4, p. 1939–1947, abr. 2001.

Florien

@FLORIENFITOATIVO | FLORIEN.COM.BR | /FLORIEN.FITOATIVO

É essencial a avaliação de um profissional da saúde para uma prescrição individualizada. Consulte seu profissional da saúde.